





Soorten Dementie



Vergeet niet te leven!

De meest voorkomende soorten van dementie



Vergeet niet te leven!

De meest voorkomende soorten van dementie

Ziekte van Alzheimer

Alzheimer is de meest bekende vorm van dementie en is verantwoordelijk voor 70 procent van de dementiegevallen. De ziekte begint vaak met geheugenproblemen en moeilijkheden bij dagelijkse handelingen. In de latere stadia treden echter veel andere symptomen op.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is, na Alzheimer, het op één na meest voorkomende type dementie. Deze vorm wordt veroorzaakt door een verminderde doorbloeding van de hersenen. De symptomen die iemand ervaart, hangen af van het hersengebied waar de schade aan de bloedvaten optreedt.



Vergeet niet te leven!

De meest voorkomende soorten van dementie

Frontotemporale dementie (FTD)

Frontotemporale dementie (FTD) komt aanzienlijk minder vaak voor dan Alzheimer en vasculaire dementie. Deze vorm treft vaak mensen op jongere leeftijd. De eerste tekenen zijn meestal gedragsveranderingen of taal- en spraakproblemen (afasie). FTD is lastiger te herkennen, omdat dementie bij jongere mensen vaak niet wordt verwacht.

Lewy body dementie (LBD)

Lewy body dementie (LBD) komt minder vaak voor dan Alzheimer en vasculaire dementie. Bij deze vorm kan de achteruitgang soms snel verlopen, maar er kunnen ook langere periodes van stabiliteit zijn. Mensen met Lewy body dementie ervaren vaak ook symptomen die kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson, zoals trillingen, beven en moeite met bewegen.



Vergeet niet te leven!

Alzheimer

Begin

Moeite met het onthouden van nieuwe informatie. Vervolgens ontstaat verlies van andere vaardigheden.

Verloop:

De klachten verergeren geleidelijk. Mensen ontwikkelen stap voor stap nieuwe symptomen.

erfelijkheid:

Erfelijke aanleg speelt boven de 65 jaar zelden tot zeer zelden een rol.

Meest voorkomende leeftijd:

Diagnoses worden meestal gesteld bij mensen ouder dan 65 jaar.

Aantal patiënten in Nederland:

Ongeveer 200.000.

Vasculaire Dementie

Begin

Traagheid in denken, spreken en handelen. Vaak ontstaan klachten door (kleine) beroertes en tia's.

Verloop:

Beginnt vaak plotseling en verloopt in stappen. Soms zijn er stabiele periodes.

erfelijkheid:

Erfelijke aanleg speelt een kleine rol.

Meest voorkomende leeftijd:

Diagnoses komen meestal voor bij mensen tussen de 65 en 75 jaar.

Aantal patiënten in Nederland:

Ongeveer 50.000.

Lowy Body Dementie

Begin

Concentratieproblemen, gevolgd door geheugenproblemen en vaak ook bewegingsproblemen.

Verloop:

De klachten variëren van dag tot dag of zelfs van uur tot uur. Over de jaren worden de symptomen ernstiger. Hallucinaties komen vaak voor.

erfelijkheid:

Erfelijke aanleg speelt zelden tot zeer zelden een rol.

Meest voorkomende leeftijd:

Diagnoses worden meestal gesteld bij mensen ouder dan 65 jaar.

Aantal patiënten in Nederland:

Ongeveer 30.000.

Frontotemporale Dementie

Begin

Gedragsveranderingen, problemen met taal of beweging. Geheugenverlies komt pas later.

Verloop:

Onvoorspelbaar: sommige mensen gaan snel achteruit, anderen juist langzaam en geleidelijk.

erfelijkheid:

Erfelijkheid speelt in 25-40% een rol.

Meest voorkomende leeftijd:

Diagnoses worden vaak gesteld tussen de 40 en 60 jaar.

Aantal patiënten in Nederland:

Ongeveer 5.0000.

Mengvormen van dementie

Het is vaak zo dat iemand tegelijkertijd meerdere vormen van dementie heeft. Dit wordt ook wel mengbeelddementie of mengvormdementie genoemd. Een voorbeeld hiervan is dat wetenschappers bij hersenonderzoek na overlijden vaak vasculaire schade aantreffen (kenmerkend voor vasculaire dementie) bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Ook een combinatie van Lewy body dementie en Alzheimer komt regelmatig voor.



Vergeet niet te leven!